

**Временная инструкция  
по применению суппозиториев гинекологических Ветомгин 8.21**

(Организация - производитель НПФ "Исследовательский центр", Новосибирская область, пос. Кольцово)

**I. Общие сведения**

1. Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21, опытная серия.
2. Препарат Ветомгин 8.21 содержит иммобилизованную высушенную спорую биомассу бактерий *Bacillus subtilis* штамм IC-16-1-1, *Bacillus subtilis* штамм IC-9-1-1 и *Bacillus licheniformis* штамм IC-1-1-2 и наполнитель лимонную кислоту и пищевую соду. Не содержит ГМО. В 1 г препарата содержится не менее  $1 \times 10^6$  КОЕ (колониобразующих единиц) живых микробных клеток.
3. Суппозиторий гинекологический Ветомгин 8.21 представляет собой цилиндр белого цвета, без запаха, легко растворим в воде.
4. Гинекологические суппозитории Ветомгин 8.21 упаковывают по 1, 3, 5, 10, 15 штук в бумагу по ГОСТ 8273, затем упаковывают в коробочку из картона по ГОСТ 7933. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией и этикеткой с указанием: наименования предприятия - изготовителя, наименования препарата, количества препарата, номера серии, номера контроля, даты изготовления (месяц, год), срока годности, условий хранения, надписи "Для животных", обозначения ТУ.
5. Хранят препарат в сухом, прохладном, защищенном от света месте при температуре от 0 до 25°C. Срок годности препарата - 48 месяцев от даты изготовления.

Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21 по истечении срока годности не должны применяться.

**II. Биологические свойства**

6. Бактерии *Bacillus subtilis* штамм IC-16-1-1, *Bacillus subtilis* штамм IC-9-1-1 и *Bacillus licheniformis* штамм IC-1-1-2, используемые для изготовления препарата, отличаются способностью к быстрой колонизации репродуктивных органов животного (вагины, шейки матки, канала шейки матки). Размножаясь, бактерии выделяют в окружающую среду специфические антибиотики, ферменты, другие биологически активные вещества.

Следствием этого процесса в вагине и прилегающих репродуктивных органах нормализуется микробный состав до видоспецифического, очищаются их стенки за счёт вспенивания суппозиториев во влажной среде, что способствует активному выводу гнойного, некротического содержимого вагины и матки, плёнок фибрина без проведения специального туалета, что способствует сокращению времени лечения, прекращению воспалительных процессов и быстрому заживлению травмированных слизистых оболочек.

7. Заживление слизистых оболочек приводит к увеличению фагоцитарной активности крови, нормализации работы местного иммунитета репродуктивных органов животного, что благоприятно сказывается на функционировании всей репродуктивной системы и предупреждает развитие хронических эндометритов.

8. Бактерии *Bacillus subtilis* штамм IC-16-1-1, *Bacillus subtilis* штамм IC-9-1-1 и *Bacillus licheniformis* штамм IC-1-1-2 иллимнируются из организма через 2 - 14 суток в зависимости от вида животного.

**III. Порядок применения**

9. Гинекологические суппозитории Ветомгин 8.21 применяют для профилактики и лечения катарального и гнойно - катарального эндометритов, вагинитов, цервитов, послеродового сепсиса у сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот, лошади, овцы.

10. Препарат назначают животным индивидуально интравагинально.

11. Для профилактики катарального и гнойно - катарального эндометритов, вагинитов, цервитов, послеродового сепсиса Ветомгин 8.21 назначают животным сразу после родов 1 раз через день в течение 10 дней по 1 суппозиторию интравагинально.

12. С лечебной целью препарат назначают животным 2 раза в сутки по 1 суппозиторию в течение 14 дней.

13. Лечебный и профилактический эффекты находятся в прямой зависимости от кратности применения суппозиториев.

14. Побочных явлений и осложнений при применении суппозиториев гинекологических Ветомгин 8.21 в рекомендуемых дозах не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено.

15. Продукты животноводства после применения препарата используются в пищевых целях без ограничений.

16. Применять препарат совместно с антибиотиками, сульфаниламидными и другими антисептическими препаратами (кроме спирта этилового, раствора Люголя) запрещается.

**IV. Меры личной профилактики**

17. Суппозитории гинекологические Ветомгин 8.21 следует хранить в местах недоступных для детей.
18. Специальных мер для личной профилактики при работе с препаратом Ветомгин 8.21 не предусматривается.